

Однією з

Іншими доказами є результати дослідження, проведеної у 1999 році в Італії (Metra M., Nodari S., D'Aloia A., et al. Heart Failure Reviews 1999; 4: 65—77).

Характер настанов та етапи застосування β -АБ	Настанови
Загальні настанови	<ul style="list-style-type: none"> — Використовувати β-АБ другого або третього поколінь* — Впевнитися у стабільноті клінічного стану протягом останніх двох тижнів — Впевнитися у відсутності важливих протипоказань (наприклад, бронхіальної астми)
Перед початком терапії β -АБ	<ul style="list-style-type: none"> — Оцінити частоту серцевого ритму, артеріальний тиск, масу тіла — Зареєструвати ЕКГ для виключення значних порушень провідності і брадикардії — Оцінити лабораторні показники: сечовину крові, креатинін сироватки, електроліти, трансамінази — Оцінити функцію лівого шлуночка (ЕхоКГ, радіонуклідна вентрикулографія) протягом одного місяця до початку терапії
Через дві-три години після призначення першої дози	<ul style="list-style-type: none"> — Оцінити частоту серцевого ритму, артеріальний тиск, симптоми — Вдатися до нижчої дози або відкласти початок терапії β-АБ у випадку гіпотензії або брадикардії
Перед кожним збільшенням дози β -АБ	<ul style="list-style-type: none"> — Оцінити симптоми, частоту серцевого ритму, артеріальний тиск, масу тіла — Уникнути або відкласти збільшення дози у випадку гіпотензії, брадикардії або наростання маси тіла
Через дві-три години після призначення кожної нової дози	<ul style="list-style-type: none"> — Здійснити нову оцінку частоти серцевого ритму, артеріального тиску, симптомів — Уникнути або відкласти збільшення дози у випадку гіпотензії або брадикардії
Упродовж наступних трьох місяців	<ul style="list-style-type: none"> — Оцінювати частоту серцевого ритму, артеріальний тиск і масу тіла кожного місяця — Зареєструвати ЕКГ для виключення значних порушень провідності і брадикардії (через два-три місяці) — Оцінити лабораторні показники: сечовину крові, креатинін сироватки, електроліти, трансамінази (через два-три місяці)
Через чотири-шість місяців підтримуючої терапії	<ul style="list-style-type: none"> — Здійснити нову оцінку функції лівого шлуночка (ЕхоКГ, радіонуклідна вентрикулографія)

* Найдовше діючі β -АБ мають довгий час дії (до 12 годин), тому їх можна вживати 1 раз на добу.

ІІ ОЕІ АЕУІ 2 АІ ЧЕ β -ААДАІ Т АЕТ КАОІ $\Theta^2\bar{A}$

Відповідно до даних дослідження, що вивчали вплив β -АБ на результати кардіодієлектрометрического дослідження серця, можна зробити висновок, що вживання β -АБ викликає зміни в електричному полі серця, які відповідають за спостережені зміни в функції серця.

